

Koadministrationsmöglichkeiten von Reiseimpfstoffen (Stand 15.03.2018)

Laut STIKO gelten folgende grundsätzliche Abstände für die Verabreichung von Impfstoffen: „Lebendimpfstoffe (attenuierte, vermehrungsfähige Viren oder Bakterien) können simultan verabreicht werden; werden sie nicht simultan verabreicht, ist in der Regel ein Mindestabstand von 4 Wochen einzuhalten. Bei Schutzimpfungen mit Totimpfstoffen (inaktivierte Krankheitserreger, deren Antigenbestandteile, Toxoide) ist die Einhaltung von Mindestabständen zu anderen Impfungen, auch zu solchen mit Lebendimpfstoffen, nicht erforderlich. Impfreaktionen vorausgegangener Impfungen sollten vor erneuter Impfung vollständig abgeklungen sein. Zu den zeitlichen Mindestabständen zwischen zwei Impfungen sowie zur Möglichkeit der Koadministration von Impfstoffen sind die Fachinformationen des jeweiligen Impfstoffes zu beachten.“

Gerade wenn vor einer Reise zahlreiche Impfungen notwendig sind und wenig Zeit zur Verfügung steht, müssen manchmal auch mehrere Impfungen an einen Tag verabreicht werden; verschiedene Impfstoffe sollten, wann immer möglich, kontralateral verabreicht werden.

	Tdap	Polio- myelitis (mono + kombi)	Influenza inaktiviert	MMR	Hep A	Hep B	Typhus inaktiviert	Typhus attenuiert	Tollwut	Gelbfieber	Meningo- kokken ACWY	Meningo- kokken B**	Jap. Enze- phalitis	Cholera
Tdap		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x*	x	x	x
Poliomyelitis (mono + kombi)	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Influenza inaktiviert	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
MMR	x	x	x		x	x	x	x	x	am selben Tag oder 1 Monat Abstand	x	x	x	x
Hep A	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x
Hep B	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x
Typhus inaktiviert	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x
Typhus attenuiert	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	1 Stunde Abstand
Tollwut	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
Gelbfieber	x	x	x	am selben Tag oder 1 Monat Abstand	x	x	x	x	x		x	x	x	x
Meningokokken ACWY	x*	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x
Meningokokken B**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x
Jap. Enzephalitis	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x
Cholera	x	x	x	x	x	x	x	1 Stunde Abstand	x	x	x	x	x	

* zeitgleiche Gabe, ansonsten MenACWY möglichst 1 Monat vor Impfung mit tetanushaltigem Impfstoff

** gerade bei neuen Impfstoffen wie MenB sind nicht immer Daten zu allen Impfstoffen vorhanden, im Zweifelsfall FI beachten; bei Zeitmangel Koadministration möglich

Impfempfehlungen und Fachinformationen unterliegen ständiger Aktualisierung und wurden für diese Tabelle sorgfältig geprüft. Eine Haftung für die hier genannten Informationen zur Koadministration kann aber nicht übernommen werden.