

Tabelle für den Impfbuch-Check

Impfung gegen	Anzahl der Impfungen im Impfpass	Datum der letzten Impfung	Sind die Impfungen vollständig?		Es fehlt/fehlen
			Ja	Nein	
Tetanus					
Diphtherie					
Pertussis					
Poliomyelitis					
Hepatitis B					
Masern, Mumps, Röteln					
Varizellen					
Meningokokken Typ C					
Humane Papillom-viren (HPV)					

Falls noch Impfungen fehlen, bitte einen Termin beim Arzt ausmachen und unbedingt nachholen lassen.

Anweisung zum „Lesen“ des Impfpasses:

Folgende Impfungen sollten für einen vollständigen Impfschutz im Alter von 9 bis 17 Jahre gegeben worden sein:

Tetanus	Insgesamt müssen 5-6* Impfungen eingetragen sein
Diphtherie	Insgesamt müssen 5-6* Impfungen eingetragen sein
Pertussis	Insgesamt müssen 5* Impfungen eingetragen sein
Poliomyelitis	Insgesamt müssen 4 bis 5* Impfungen eingetragen sein
Hepatitis B	Insgesamt müssen 3 Impfungen eingetragen sein
Masern, Mumps, Röteln (MMR)	Insgesamt müssen 2 Impfungen eingetragen sein
Varizellen	Insgesamt müssen 2 Impfungen eingetragen sein
Meningokokken Typ C	1 Impfung (mit Konjugatimpfstoff) reicht aus
Humane Papillomviren (HPV)	Insgesamt sind 3 Impfungen nötig (nur Mädchen zwischen 12 und 17 Jahren)

* Die Auffrischimpfung bei Jugendlichen von 9 bis 17 Jahre gegen Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten und Polio (1 Dosis) ist dabei schon berücksichtigt.

** Seit Juli 2009 werden generell 2 Impfungen gegen Windpocken empfohlen, wer bisher nur 1 Impfung erhalten hat, benötigt nun noch eine 2. Impfung.

Quelle: Deutsches Grünes Kreuz, August 2009